新刻萬氏家傳廣嗣紀要卷之三

羅田萬全著
黄岡門人蔡朝衣校
建邑書林余良史梓

○妊娠傷寒

凡十五論十二方

丹溪活套婦人胎前感冒風寒頭痛發熱或身體疼痛用四物湯合小柴胡湯或更加細辛白芷羌活防風等藥

河間云大抵胎病天行從增損柴胡雜症從增損四物然春夏須從柴胡秋冬必用四物藥性寒熱病症虛實不可不察也

又云治產前寒熱小柴胡去半夏謂之黄龍湯

容齋云妊娠傷寒專以清熱安胎為主或汗或下各宜隨其五臟表裏所見脉症主治勿犯胎氣故在表發汗以香蘇散為主方半表半裏則和解之以黃龍湯為主方在裏則下之以三黃解毒湯為主方此吾家傳之秘活人甚多如古方六合湯雖分治詳明猶不及此切當

凡妊婦傷寒勿論日數但見悪寒頭疼宜香蘇散主之

紫蘇二銭　香附二銭炒黒　陳皮一銭　甘草半銭　姜三片　葱五根

煎服　○頭痛加川芎白芷各一銭名芎芷香蘇散

假令得肝脉其外症善潔面青善怒其三部脉俱弦而浮悪寒裏和謂清便自調也本方加羌活防風各一銭謂肝主風是膽受病也

假令得心脉其外症面赤口乾善笑其三部脉俱浮而洪悪寒裏和

謂清便自調也本方加黄芩石膏各銭半謂心主熱是小腸受病也

假令得脾脉其外症面黄善噫善思尺寸脉倶浮而緩悪寒裏和本方加白术防已各銭半謂脾主濕是陽明受病也

假令得肺脉其外症面白善嚔善悲不楽欲哭其尺寸脉倶浮而濇悪寒裏和本方加黄耆防風各一銭謂肺主燥是大腸受病也

假令得腎脉其外症面黒善恐其尺寸脉倶浮而濡悪寒裏和本方加附子炮一銭謂腎主寒是膀胱經受病也附子犯胎用炙薑温之可也

河間云解利傷寒不問何經所受皆能觧之謂不犯各經之受病雖不能觧盡亦無壊症羌活湯尤益姙婦

羌活二銭　防風　川芎　黄芩　甘草炒各乙銭　細辛三分半

白芷錢乙　白朮錢半無汗用蒼朮　水煎服無時
其妊婦傷寒得之三五日後有悪寒發熱内有煩渇引飲小便赤澁
之症此邪在半表半裏也宜黄龍湯主之
柴胡二錢　黄芩錢半　人参錢乙　甘草錢乙　姜棗引
如寒熱往来無汗口乾加葛根二錢去棗入葱白三根
如頭疼不止加川芎白芷各一錢去棗加葱白三根
如發熱有汗口渇加白朮括蔞根各錢半
如脉浮大有力大熱大渇本方合人参白虎湯去姜棗
如心煩不得臥本方加白茯麥門冬各乙錢
如嘔噦加半夏製白茯各一錢去棗
如胸脇滿痛加枳殼炒香附子炒黒川芎各一錢

如大便秘本方初加大黄五分得利即止不利加一钱以利為度
其姙婦傷寒五六日後表邪悉罷並無頭疼悪寒之症止煩燥発熱
大渇小便赤大便秘或利下赤水六脉沉實此病邪在裏也宜三
黄解表湯主之
黄蘗　黄芩　黄連　山梔　大黄等分　水煎更随五臓脉症
加減
假令得肝脉其内症煩満消渇溲便難尺寸脉沉弦有力是肝經本
臓受病也本方加當歸一钱半甘草五分倍山梔
假令得脾脉其内症腹脹満讝妄其脉沉緩有力是脾經本臓受病
也本方加枳實炒厚朴姜汁炒各一钱半倍大黄
假令得心脉其内症煩燥心痛掌中熱而噦尺寸脉沉数有力是心

經本臟受病也本方加麥冬一錢竹茹一團倍黃連
假令得肺脉其內症喘咳胸滿尺寸脉沉濇有力是肺經本臟受病
也本方加葶藶炒一錢桔梗五分倍黃芩
假令得腎脉泄如下重足脛寒而逆尺寸脉沉而石是腎經本臟受
病也加乾姜炮五分熟地黃錢半倍黃蘗
其娠婦傷寒發汗後汗漏不止胎氣損者加減當歸湯
歸身　黃耆炙　生地黃　黃芩　白朮　阿膠珠　炙草各等分
浮小麥撮　煎湯盞半去麥每服五錢煎七分溫服
其娠婦傷寒下後協熱而利不止胎氣損者宜加味黃芩湯
黃芩二錢　白芍　白朮　白茯　炙甘草　阿膠各一錢　水盞半
煎一盞後入阿膠再煎八分服

其娠婦汗下後熱不除者虛也加味竹葉湯主之

人参　麦冬　炙草　阿膠　生地黄各乙銭　竹葉十二　粳米合引

其娠婦傷寒差後發熱者宜黄龍湯四物湯主之因於食者本方加枳實

其娠婦傷寒熱極發斑狀如錦紋者宜四物湯去川芎加黄芩

人参　知母石膏　玄参　大青葉主之

其娠婦熱病護胎法夫姙婦感非時之邪熱毒之氣侵損胞胎遂有動胎漏血致害子母之命用白藥子不拘多少為末以鷄子清調攤於紙上如碗大貼臍下胎存處乾則以温水潤又方以灶心土研細水調塗臍下乾又易之又方以井底泥敷心下令胎不傷又

方用乾浮萍朴硝大黄炒蛤粉板藍葉共為末水調貼臍下安胎

解燥熱和臟腑

其娠婦値天行熱病壯熱百節疼痛不急治即堕胎

柴胡　知母　葛根　石膏各六銭　大青八銭　梔仁一兩

升麻八銭　葱白切半盡　水七盞煎三盞分四服服之

其姙娠熱病六七日極者傷胎兒死腹中身冷不能自出須用落胎

藥服黒神散温酒調煖胎自出譫語不若用催生湯

蒼朮二兩　桔梗一兩　橘仁六銭　白芷　桂心去皮各二銭　炙草二銭

乾姜炮　當歸　厚朴制　芍薬　半夏洗　川芎

枳殻炒各四銭　杏仁炒　木香各一銭　水盞半姜棗引

姙娠霍亂一論一方

霍亂者陽明經病之別名也陽明者胃也蓋因平日五味肥膿腐積成痰七情鬱結氣盛為火停蓄胃中乍因寒熱之感邪正交爭陰陽相混故令心腹絞痛吐利併作揮霍撩亂故名霍亂如邪在二胃脘則當心而痛其吐多邪在胃脘則當臍痛其利多邪在中脘腹中痛吐利俱多吐多則傷氣利多則傷血血氣受傷不能護養其胎況邪氣鼓擊胎氣震動壽未有不殞者矣此危惡之症不可不亟治也宜前香蘇散加藿香葉主之

香蘇散一劑　藿香葉　縮砂五分各

如轉筋加木瓜一錢

胎動不安加白朮錢半

如夏月得之加黃芩錢半黃連一錢香薷二錢

如冬月得之加人參白朮各一錢乾姜炮五分

○姙娠風痓

又名子癇一論二方一按

痓俗作痙痓乃太陽膀胱病之別名也論曰姙娠中風頸項強直筋脉攣急言語蹇澁痰涎壅盛或發搐不省人事名曰子癇亦有臨月發風或暈悶倒地不識人吐逆如癇亦名子癇治各有方

其因中風腰背強直時復反張無汗者宜防風葛根湯主之

防風　葛根　生地黄　川芎各二錢　杏仁去皮尖　麻黄去節各錢半

桂枝少許　獨活　甘草　防巳各乙錢　右㕮咀分二貼毎水盞半煎麻黄去沫入藥煎八分温服以安為度不安連服勿間

其有汗者或發搐不省人事者宜羚羊角散主之

羚羊角鎊　川獨活　酸棗仁炒　五加皮各半錢　薏苡仁

防風　當歸　川芎　茯神　杏仁去皮尖各四分　木香　甘草各二錢

水中半姜三片煎服如上法

其臨月發者宜葛根湯主之

葛根　貝母　陳皮　防風　防巳　川芎　當歸　白茯

桂枝　澤瀉　人参　獨活　石膏　炙草各等分

毎貼七錢水二盞煎八分不拘時貝母令人易産未臨月用升麻代之

竊齋師在鄭陽時値鄭縣知縣一婢臨月患此病口眼喎邪腰背反張手足攣曲不省人事請師治之用黄連解毒湯方加硃砂末錢開口灌之稍定其夜生一男主謝曰以一劑之藥活二人之命其功大矣産後病也昏迷不省以七珍湯與之即安

○姙娠心腹腰諸痛　凡三論九方

姙娠以安靜為貴但有心腹諸痛便是胎氣不和此胎氣之為毋病者也若因飲食不調惱怒不已或素有痰氣發作無時者此毋病之害其胎氣也須分治之

丹溪云凡心氣諸痛不可用參朮補氣其痛愈甚

師謂治諸心腹者用香蘇散加砂仁最妙

其二　三月娠忽心腹腰痛不安此肝氣不和也

當歸三銭　阿膠珠二銭　炙草乙銭　葱白四銭　水煎

其三　五月娠忽心腹絞痛者此心氣不和也

大棗十四个燒令黒　盐煆乙銭　為末取一撮許酒調服愈

其婦心痛氣欲絶者火龍散主之
艾葉末 塩炒乙兩半 茴香炒 川練子去核各乙兩 右為末每服貳
銭水一盞煎七分食後服
其婦腹中絞痛心下急痛者當歸芍藥湯主之
白芍藥四兩 當歸三兩 白茯乙兩 澤瀉乙兩 川芎二兩 炙草乙兩
共為細末每服三銭食前温酒調服蜜丸亦可
其娠姙無故下血腹痛不可忍或下黃汁如漆水如豆汁
野苧根炒 金銀花各乙兩 酒水各一盞煎服
其婦素有冷氣心痛如刀刺及腹痛者加減當歸散主之
當歸 香附黒炒 川芎各三兩 青皮二兩 呉茱萸半兩七次炮
右為末温酒調一銭服無時

核上之字恐有誤

其姙娠婦腰痛不可忍者通氣散神妙

破故紙（不拘多少瓦上炒令香）右為末嚼胡桃肉半个空心温酒調服二銭

其因於七情者前方香蘇散加砂仁木香各五分

其因於飲食者香蘇散加白朮枳實各二銭砂仁五分

○姙娠瘧　凡一論四方

瘧者苛毒苦惱之名也寒則凜凜湯火不能禦熱則蒸蒸氷雪不能觧所謂來如風火去似微塵易受而難退也有身子之婦豈堪忍受方其初得急驅逐之及其久也須和觧之勿犯胎氣勿傷胃氣此之之大要也

初病之時小柴胡合四物湯以解之解之不退宜常山飲截之

知母 川常山 各二錢 炙草 乙錢 烏梅 乙錢 酒水各盞半桃枝七寸露一宿發日五更服面東如吐勿忌得吐即止

其久瘧不可再截只以補脾和胎為主宜加味異功散主之

人參 白朮 白茯 炙甘草 陳皮 當歸 黄芩 柴胡 等分 右為末每服一錢米飲下日三服得汗而解或加九肋鱉甲作丸服之妙

如寒多熱少者驅和散主之

良姜 炒 白朮 草菓仁 藿香葉 陳皮 縮砂 白茯 各五分 炙草 二分半 姜五片 棗一枚 服不拘時又治食瘧

如熱多寒少者加味白虎湯主之

生地黄半銭 黄芩 麦冬 人参 知母 葛根各乙銭

石膏二銭 甘草五分 烏梅半个水煎亦治暑瘧

○妊娠吐瀉 凡論二方

吐利併作者霍亂也常吐者悪阻也治法在前惟忽然嘔吐者勿認悪阻須詳審之如吐清水同食物出者寒也宜理中湯主之

人参 白朮各乙分 炙草三分 乾姜炮五分 藿香葉五分 水盞

半煎七分入姜汁丁匙

如吐酸水同食物出者熱也宜加味二陳湯主之

陳皮半分 白茯 半夏炒各乙分 甘草三分 黄連姜汁炒

呉茱萸炮去皮三分　水中半姜五片煎服

妊娠多食瓜菓生冷及當風取凉則令胎冷腹脹虚疼腸内虚鳴臍下冷痛大便滑瀉宜安胎和氣飲主之

訶子麺煨去核　白朮各二銭　陳皮　良姜炒　木香　白芍炒
陳粟米炒　炙草各半銭　分二貼水二中姜五片煎服如瀉久不止恐其傷血無以養胎宜加減八珍湯主之

人参　白朮　白茯　炙草　當歸　生地　白芍
阿膠各等分　水中半煎一中入阿膠煎八分食前服如不止煎服三物桃花丸

赤石脂　白龍骨等分　乾姜炒焦減　右為末粥糊丸梧桐子大每服三十丸或五十丸米飲下

○妊娠痢疾 一論五方一案

病属濕熱努責之時胃氣下陥胎氣墜不亟治之恐其傷胎

初病腹中脹痛裏急後重宜下之三黄解毒湯主之方見前

腹中徹痛裡急後重用河間行氣後重自除養血則下利自止法宜

芍藥湯主之

白芍乳 當歸 黄連各五分 梹榔二分 木香分 桂少許

大黄三分 黄芩一分 炙甘草三分 右㕮咀水盞半煎八分食

前服又芍藥蘗皮丸常服

白芍 黄蘗各一両 黄連 當歸各半両 右為末水丸小豆大

每五十丸陳米飲下

大抵妊娠痢疾以清熱解毒為主此治濕熱之聖薬也

妊娠下利赤白腸鳴後重谷道疼痛黄連阿膠丸主之

黄連　砂仁　帰身　阿膠炒　白朮各一両　乾姜炒二分半

枳殻炒五分　炙甘草三分　右為末塩梅肉三个入少醋糊同杵

丸陳米湯下

妊娠膿血下痢状如魚脳小腹絞痛難當

地楡　黄連　阿膠另煎　酸石榴皮等分　水煎

臨産痢疾用巵子焼存性末之空心熟水調下一匙甚者不過五服

或用四物湯調枳殻散服効

雍田典史熊鏡妻有娠先於五月病熱請女醫朱廷和治之変瘧又

請萬元献壬子新人治之加痢至八月瘧痢並作請師調治診其脉左

手沉實有力右手浮大而虚此乃男娠内傷病也用補中益氣湯加條芩倍白朮連進十餘服瘧痢俱止後以胡連丸調理而安次年春果生一男

○妊娠喘嗽 凡一論四方

妊娠喘嗽當分二症有風寒外感者有胎氣内壅者須詳審之其風寒外感者必發熱鼻塞聲重初病之時宜發散之桔梗散主之

天門冬　茯苓各一分　杏仁去皮尖　人参　甘草　桑白皮蜜炒

紫蘇葉　桔梗各五分　麻黄去節七分　姜三片水煎

久嗽不止謂之子嗽引動胎氣胎必不安宜紫菀湯主之

天門冬　紫菀各二分　桔梗五分　甘草　杏仁去皮尖

桑白皮蜜炒各二分半　防風三分　右㕮咀水二盞竹茹一塊煎八分
入蜜半匙再煎一沸服
如服上藥不止或痰中有血者宜門冬清肺飲主之
天冬　麦冬各一分　桑白皮蜜炒三分　杏仁去皮尖　黄芩　五味子
阿膠　桔梗　甘草各五分　蘇葉五分　烏梅肉半个　水煎
服痰盛加陳皮五分淡竹瀝一合有血加生地黄一錢大薊根
茅根汁各一二匙
妊娠七八月以后受肺與大腸之氣胎氣壅盛咳嗽喘急宜馬兜苓
散主之
兜苓　桔梗　枳殼炒　甘草　陳皮　大腹皮　蘇葉各乙分
五味子七粒　姜三片水煎

○姙娠子淋　附不禁　凡三論六方

子淋之病須分二症一則姙母自病一則子為母病然娠母自病又分二症或服食辛燥因生内熱者或自汗自利津液燥者其子為母病亦分二症或胎氣熱壅者或胎形迫塞者症既不同治亦有別也大抵熱則清之燥則潤之壅則通之塞則行之此治之之法也

娠婦奉養太厚者喜食炙煿酒麪辛燥之物以致内熱小便赤澁作痛者宜加味木通湯主之

木通　生地黄　赤芍　條芩　甘草稍等分　淡竹葉十二片水煎

妊婦嘗病自汗或因下痢後小便短少不痛者此津液不足也

麥冬　通草　滑石各三分　當歸　甘草各五分　人參

細辛各二分　右為細末每服二三錢燈心煎湯空心服

娠婦素淡滋味不嗜辛酸病小便赤澁而痛者此胎熱也宜冬葵子

湯止之

冬葵子一兩　赤芍　條芩各半兩　赤茯　車前子各三錢　右末

每二錢米飲調服不拘時如小便不通恐是轉胞加髮灰少許

極妙

娠婦八九月胎形肥碩小便短少小腹脹身重惡寒起則暈眩欲倒

此胎氣迫塞膀胱之氣不行也宜大腹皮散主之

枳殼炒　大腹皮　甘草炙各一分　赤茯苓三分　右為末每服

一錢濃煎葱白湯下不拘時一方有黄芩一錢

一娠婦淋瀝小便不通醫作轉胞治之不愈後用檳榔赤芍藥二味研末順取長流水煎湯調服效此方治男婦一切血淋及淋澁水道疼痛用之無有不效

娠婦九个月後多小便不禁者胎下墜也凡見小便頻數或自出不覺其勢將産不須治之如九月已前遺尿不知出者此病也用真桑螵蛸十二个炙焦為末空心米飲調下

又方用白薇白芍藥等分為末酒調方寸匕日三服

要略云娠婦小便難飲食如故歸母苦參丸主之

當歸　貝母　苦參各四兩　右為末煉蜜丸如小豆大米飲下三丸加至十丸

婦人懷胎有傷腹滿不得小便從腰以下重如有水氣狀懷身七月
太陰當養不當養此心氣實當刺瀉勞宮及關元小便微利即愈

○娠姙轉胞 凡二論一方一案

仲景曰婦人本肌肥盛頭舉身滿反羸瘦頭舉中空胞系了戾亦多
致此病但利小便則愈宜服腎氣丸按此方以中有茯苓故也地
黄為君功在補胞 方見上卷
丹溪曰轉胞之病胎婦之禀受弱者憂悶多者性急躁者食味厚者
廱或有之古人皆用滑利疎導藥鮮有應効因思胞不自轉為胎
所壓展在一邊胞系了戾不通耳胎若舉起居於其中胞系自通
水道自利然胎之墜下必有其由近吳宅寵人患此遂用四物湯

加参术等藥空心飲隨以指探喉中吐出藥汁俟少頃氣定又與一貼次早亦然如是與八貼而安此法未為的確恐偶中耳後又歴用数人皆效未知果如何耶方名参术散

四物湯加人参白术半夏陳皮甘草○入姜煎空心服

呉宅寵人患轉胞兩脉似濇重則弦左稍和予曰此得之憂患濇為血少氣多則胎氣弱而不能舉弦為有飲血少則胎弱氣多有飲中焦不清而隘則胞知所避而就下乃以參术散與服去八貼而安

○妊娠便秘

便難之病為熱属血虚宜潤腸丸主之

火麻子去殼取淨仁二兩淨研　杏仁去皮尖一兩生用另研

右和勻研極細末蜜丸梧桐子大每服三十丸空心枳殼湯下

○妊娠雜症

凡十三症十三方三案

娠婦冬月中寒宜理中湯加細辛主之

娠婦夏月中暑宜人參白虎湯加黃連主之

娠婦傷食宜香蘇散加白朮枳實炒黃連主之

娠婦夏秋之間中濕宜平胃散加黃蘗主之

娠婦胎不長者血氣不足也五六月脾胃脉養之時宜十全大補湯
去桂加陳皮姜棗引

娠婦胎肥者八月以後胎氣壅盛宜常服枳殼散易產

商州枳殼炒五两　炙粉草一两　香附炒黒一两

右為末每服二錢空心沸湯調服一方有糯米半斤炒同為末令児易産初生胎寒徹黒百日後肥白此為古方之冠若娠婦稍弱者単服恐胎氣腹痛胎弱多驚王隠君于内加當歸一两木香半两不見火如此用之則陽不致強陰不致弱二氣調和有益胎嗣

湖陽公主胎肥難産方士進瘦胎散用枳殼四两和甘草二两為末空心服六錢七茶調服

姙娠胎驚者七八月以後胎形既成或因氣悶或因喧呼心神脉亂致令子驚使母心神忪悸睡裏多驚坐卧不寧氣急逼迫宜服大聖散保安胎孕子母無虞

白茯　川芎　麦冬　炙草　當歸　木香　人参　炙耆等分

右㕮咀每服七錢水中半姜三片煎服

妊娠胎熱者皆因娠婦多居火間衣著太煖伏熱在裏又食酒麵炒煿熱物太過致令胎熱頭旋眼暈食物不見腮項腫核若加涎壅命在須臾此肝臟毒熱上攻也宜消風散主之

石膏炒　菊花　當歸　羗活　防風　荊芥　川芎
白芷各半錢　羚羊角半錢　炙草半錢　茗苦茶一錢
大豆黄卷炒一分　二貼水煎

娠婦將臨月而眼忽然失明不見燈火頭痛眩暈項腮腫不能轉諸醫治療不痊轉加危困偶得消風散服之病減七八獲安分娩其眼吊起人物不辨有人云只服四物湯加荊芥防風更服眼科天門冬飲子但以此二方間服日漸稍明大忌酒麵煎炙鷄魚鵞

鴨豆腐辛辣熱毒物並房労不然則眼不復明也天門冬飲子

天門冬　茺蔚子　知母各二分四分　茯苓　羌活　五味子

人参各一分八分　防風二分一分

㕮咀分二貼毎水二盞姜三片煎八分服

妊婦七八月忽然無故悲傷欲哭状如神霊所作数欠伸者此名臓燥乃肺也宜甘麦大棗湯主之出要略

甘草三両　小麦一升　大棗十枚　三味以水六升煮取三升分三服

妊娠失音不語竒病論帝問曰人有重身九月而瘖者何也岐伯對曰胎之絡脉絶也胎絡者繋于少陰之脉貫腎絡舌本故不能言帝曰治之奈何岐伯曰無治也當十月復

婦人有娠故服毒薬攻胎薬毒冲心外症牙関緊急口不能言両手

強直握拳頭低自汗身微熱與中風子癇相似其脉浮数十死一
生醫者不識作中風治之更不審問必致損絶宜用白扁豆一味
研末新汲水調幹開口灌之 此症不正之婦有之

妊娠兒在腹中哭宜黄連湯主之

黄連三分 甘草一分 濃煎二味令母呷之

又方用半年空屋下鼠穴中土一塊令母含之即止

一云臍帶上疙瘩乃兒口中含者因娠婦登高取物脱出兒口以
此作聲令娠婦曲腰在地拾物使兒復得入口即止

容齋云 此症臨月將產婦人有之師母銭氏嘉靖戊子有娠九个月
兒在腹中哭銭大驚令作男子拜而止之過二十日生師兄和孝也

娠婦日月未足而腹痛如欲産者用知母一味為末蜜丸鷄頭實大酒化下

○預防難産

丹溪云世之難産往往見于鬱悶安佚之人富貴奉養之家若貧賤辛苦者無有也方書止有瘦胎飲一論而其方為湖陽公主設也實非極至之言何者有此方其難自若予族妹苦于難産正與湖陽公主相反今其有娠五六个月遂于大全方紫蘇飲加補氣藥與十数貼因得男而甚快遂以此方随母之形色性禀参以時令加減與之無不應者因名曰達生散

大腹三分　人参五分　陳皮五分　白朮一分　白芍一分　炙草二分

紫蘇梗葉五分　歸身一分　入青葱五葉　黄楊脳七个此即黄楊樹葉稍見也

或加枳殻砂仁以水煎食後服于八九月服数十貼甚

按芎字疑䓖字之誤

得力

夏加黃芩。冬不必加。春加川芎。或有別症以意消息。

氣虛加參朮。氣實香附陳皮。血虛倍歸芎。形實倍紫蘇。

性急加黃連。有熱加黃芩。濕痰加滑石半夏。

食積加山査。食後易飢倍黃楊。腦腹痛加木香桂。

予族妹苦于難産。後遇胎孕則觸去之。予甚憫焉。視其形肥而勤于針指。靜思旬日。忽自悟曰。此症與湖陽公主相反。彼奉養之人。其氣必實。耗其氣使和平。故易産。今形肥知其氣虛。久坐知其不運。而其氣愈弱。久坐胞胎因母氣不能自運尒。當補其母之氣。則兒健而易産。今其有孕至五六个月。遂與達生散十帖。遂得男而甚快。

又云難產多是氣血虛亦有氣血凝滯而不能轉運者亦有八九个月內不能謹欲者

丹溪束胎丸至七八个月內服之

黃芩（夏一兩 秋七錢 冬五錢 春七錢） 白朮二兩 茯苓七錢五分 陳皮三兩（並不見火）

右爲末粥丸梧桐子大每服三四十丸白湯下

又方第九箇月服

黃芩一兩（酒炒焦 怯弱者減半） 白朮一兩 枳殼（炒七錢半） 滑石（七錢半 小便多者去之）

右爲末粥丸梧桐子大每三十丸空心白湯下多則恐損元氣 劉宗厚按世俗婦室姙娠雖有服束胎藥者蓋局方良方諸法未能盡其妙用者多輒動娠故率不敢行然丹溪先生因繫已上三方以備世俗取擇好生君子之一端也

宓齋云婦女之懷胎有膏粱藜藿勞佚苦樂之殊豈必人人有産難之厄哉自湖陽公主後始有瘦胎之論前此有寤生者豈無法耶今之娠婦未有盡服束胎藥者盡生育者婦人之常非病也故不用藥耳惟素有産難之苦者不得不講求其方以為保生之計其束胎之方用各不同如枳殻瘦胎散及用滑石方氣實多痰者宜用之達生散束胎丸氣虚血少有熱者宜用之若不審其虚實不若不服之善也

圻水朱宅一婦女李氏嘗苦難産其夫以情叩師求方且曰形頗壯性急食少子思此氣滯也與一方枳殻甘草香附子為主當歸川芎白朮陳皮佐之至八九个月内每月服三貼後生三子甚快

張氏方臨月服之束胎易産行氣寛膈

枳殻炒五两　甘草两半　香附子二两半　右為末姜湯點服

○難産七因　全著

一因安佚葢婦人懷孕血以養之氣以護之宜常行動使氣血周流胞胎活潑不可久坐久卧也今富貴之家愛惜娠婦惟恐労役任其安佚久坐久卧以致氣滞而不運血滞而不流胎亦沉滞而不轉動故誕彌厥月而難産矣試観貧賤之婦親執井臼之労勤動不倦生育甚易者彼何如哉若是難産者宜於八九个月常服達生散

二因奉養葢胎之肥瘦氣通于母母之所嗜胎之所養也故懷娠之婦宜節飲食淡滋味一切肥甘之味皆當遠之不惟母無産厄子

按膿又當作醲

亦少病矣今富貴之家惑于俗論謂非辛熱則胎不煖非肥膿則胎不長恣食厚味而不知節以致胎肥而難產也試觀糟糠之婦藜藿之腸何以無產厄哉是以難產者宜于八九月間多服瘦胎散及張氏方

三因淫慾蓋古者婦人懷娠之後即居側室不共夫寢者保養胎氣也今之為夫者縱慾而不休為婦者貪歡而不忌至七八个月之間肥形已具情慾猶昔以致敗精濁液粘帶胞胎故臨產不利也何以知之其子生下頭上有白膜一片俗呼為戴粱生者是也若此者宜服瘦胎丸加滑石

四因憂疑按兵法曰禁祥去疑恐惑衆也而今人家求子之心既切保胎之計甚竦或問命卜或禱覡神殊不知談其禍福者惑人之

聴信于祈祷者干鬼神之怒此等無益之事適増有娠之憂心常疑懼産必艱難也若此者必戒卜筮常使娠婦聞正言見善事為貫觀不正之女多産厄者可以理會

五因軟怯如少婦初産者神氣怯弱子戸狹隘常懐恐怖之心不任圻副之苦當産之時腰曲不伸脚直不開展轉傾側兒不得出又如中年婦人生育既多氣血亦損當産之時氣虚血少生理不遂若是二者淹延数日針薬不施子母獲安者鮮矣

六因倉皇娠婦臨産自覺兒身轉移肥漿流溢腰腹急痛門戸張迫當是時也兒欲奔出母則着力一送兒便下矣若兒身未轉胞漿未破腹中陣痛乍作乍止當是之時寛心忍耐直待如上形状然後使力可也有等粗俗穏婆不認正産弄産但見腹痛遽令努力

娠婦無主只得聽從以致或逆或橫子母殞命皆倉皇之失也

七因虛乏之娠婦當產之時胞漿已破着力逼送視兒欲出之勢或急或緩順其勢而利之可也若使兒未欲出用力太早及兒欲出母力已乏使兒留住產戶之間津液乾澁產育艱難若是者可以大補血催生湯救之

○育嬰方論

諺云寧醫十男子莫醫一婦人寧醫十婦人莫醫一小兒非以小兒口不能言脉無可診為啞科歟傳曰如保赤子心誠求之雖不中不遠矣大抵小兒之病有三一曰稟賦不足二曰胎毒三曰乳食所傷蓋稟賦不足者稟父弱母精耗血虛胞胎之氣既虧血肉之

軀先損既生之後目無精采啼聲不揚顱解髮稀皮薄肉軟齒久不生行坐過遲者皆稟賦不足之病也宜夫補腎地黃丸主之胎毒者父餌壯陽之丹母飲煖宮之藥交接無度淫火猖狂飲食不忌膏粱内變令兒受之丹瘤瘡疹驚癇臍風盤腸内吊之病作矣宜保嬰解毒丸主之乳食所傷者小兒腸胃脆薄乳食過多雑以傳化而父母溺於護愛惟恐飢之凡肥甘生冷與食之以致宿食成積久積成癖而吐瀉瘧痢腫脹腹痛疳蟲之病生矣宜肥兒丸主之

小兒肝常有餘病多驚癇琥珀抱龍丸主之脾常不足病多疳癆集聖丸主之

八味地黃丸　治稟賦不足腎氣虛弱骨髓枯竭顖大頭縫不合

體瘦語遲行歩多艱齒生緩者

乾山藥 去黒皮　山茱萸 酒ニ拌潤蒸軟去核取肉焙乾ス　熟地黄 酒洗焙乾各五分

鹿茸 蜜塗炙酒ニ浸炙亦可ナリ　川牛膝 各酒洗焙四分　牡丹皮 去心净洗

白茯苓 去皮各三分　澤瀉 二分

右剉焙研為細末煉蜜丸如麻仁大毎服十五丸或二十五丸至三十五丸空心温塩湯下温酒亦佳ナリ

保嬰觧毒丸治胎熱胎驚胎黄臍風丹熛瘖疹一切胎毒

甘草 半生以觧毒半熟以温中　黄連 去枝梗觧毒瀉火各三分　黄蘗 去皮蜜水炒瀉陰火二分

辰砂 二分 水飛鎮驚觧毒

共為細末臘雪水杵和為丸如芡實大未周歳者半丸周歳者一丸燈心煎湯化下

肥児丸健脾胃進飲食消積滞殺疳蟲補疳瘵長肌肉乃保嬰之第一方也

人参 三分去蘆　白朮 堅白者去蘆五分　橘紅 五分刮浄

甘草 二分去皮炙　青皮 四花者去穣三分　縮砂仁 二分五分　白茯苓 去皮四分　木香 二分五分

山薬 刮浄五分　蓮肉 去皮心五分　使君子 去殻二分　山楂子 蒸取肉三分

三奇神麺 炒三分

共研為極細末用生荷葉包粳米煮熟去荷葉将米杵爛以浄布扭出再煮成糊為丸如麻仁毎服二十五丸或三十五丸至五十丸

陳倉米 炒熟煎湯不拘時服

琥珀抱龍丸抱者養也龍者陽之象也易曰震為龍一陽初生乃少陽之氣震為乙木内應乎肝小児初生純陽之体肝常有餘故立

此方以抱龍名者所以保養陽氣使不至於暴泄滋益陰精令得制平炎光也常服祛風化痰鎮心解熱和脾胃益精神尤保嬰之第一方也

真琥珀 天竹黄 白檀香（細剉） 人參（去蘆） 白茯苓（去皮已上五味各一兩五錢）

粉草（去皮郎三兩） 枳殼（水浸潤去穣麩炒黄色） 枳實（去瓤製各一兩）

硃砂（水飛五兩） 山藥（去黑皮一斤剉碎慢火炒令黄熟勿焦） 牛膽南星一兩

金箔（一百个另篩入藥中和匀）

右一十一味除硃砂金箔另製檀香不見火外九味或晒或焙同研為末和匀硃砂金箔每壹兩重取新汲井水一兩重入乳鉢內畧杵匀隨手丸如芡實大約五分重一粒陰乾晴霽略晒日色燥甚則拆裂宜放當風處取其自乾百日內兒每丸作三次一歲已

上者一丸或二丸並用薄荷湯化服

痰壅嗽甚淡姜湯　感冒風寒葱湯下　痘疹驚癇搐

滚白水下　心悸不安燈心湯下　中暑迷悶麥門冬湯下

凡合此藥品味必備但缺一味製不依法即不效也常用瓦罐收貯

勿令泄氣

集聖丸　治小兒疳瘦發熱肚大青筋頭皮光緊髮稀作穗喜喫

泥土此治疳病之第一方也

蘆薈　五靈脂　夜明沙洗淨焙　縮砂仁　陳皮　青皮去穰

莪术煨　木香　使君子去殼煨各二分　黄連去皮梗

乾蟾炙焦去足各三分　疳瘦加當歸　川芎各二分

共為細末用豬膽二枚取汁和藥入糕糊丸麻子大陳米飲下